



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.1.β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29 . 08 .2019  
Αριθ. πρωτ: 7312/175337

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  
Τηλέφωνο: 210 928 7225  
e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

Προς: Finchimica S.p.A.  
Δια της:  
‘Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ’  
με Δ.Τ. ‘AGRIBIZ’  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
[a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) KITROFIN (pyriproxyfen 10% β/ο)»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
6. Την από 14.06.2019 αξιολόγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως Αρμόδιας Εθνικής Αρχής.
7. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
8. Τις με αριθ. πρωτ. 11147/146769/26.10.2018 και 7312/175337/15.07.2019 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

**14714**  
29.08.2019  
31.12.2021

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

**KITROFIN**  
EC (Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο)

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Pyriproxyfen</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>98 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	παράγωγα της πυριδινίλης (pyridinil)]
Παρασκευαστής	<b>Finchimica S.p.A.</b> Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Ιταλία Contact Person: Carlotta Casalegno Τηλ.: +39 02 3569961 Fax: +39 02 38201446 e-mail: <a href="mailto:Regulatory.manager@finchimica.it">Regulatory.manager@finchimica.it</a>
Εργοστάσιο παρασκευής	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>RUDONG ZHONGYI CHEMICAL Co., Ltd</b> The Second Haibin Road, Coastal Economic Development Zone Rudong, Jiansu, P.R., China 226407
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>Pyriproxyfen</b> όπως αυτές αξιολογήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης

**Finchimica S.p.A.**  
Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Ιταλία  
Contact Person: Carlotta Casalegno  
Τηλ.: +39 02 3569961  
Fax: +39 02 38201446  
e-mail: [Regulatory.manager@finchimica.it](mailto:Regulatory.manager@finchimica.it)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ**  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174  
Fax: 210 7471009  
E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**  
Θέση Ξηροπηγάδο, 19600, Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431  
Fax: 210 5556100  
E-mail: [ellagret@ellagret.gr](mailto:ellagret@ellagret.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Finchimica S.p.A.**  
Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Ιταλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. **Schirm GmbH**  
Geschwister-Scholl-Straße 127  
39218 Schönebeck (Elbe)  
Γερμανία
2. **Sipcam S.p.A.**  
via Vittorio Veneto, 81  
26857 Salerano sul Lambro (LO)  
Ιταλία
3. **IRCA Service S.p.A.**  
S.S. Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Ιταλία
4. **GALENKA – FITOFARMACIJA a.d.**  
Batajnicky drum b.b.  
11080 Belgrade  
Σερβία
5. **DIACHEM S.p.A.**  
Via Tonale, 15 – 24061  
Albano S. Alessandro (BG), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Schirm GmbH**  
Geschwister-Scholl-Straße 127  
39218 Schönebeck (Elbe)  
Γερμανία
2. **Sipcam S.p.A.**  
via Vittorio Veneto, 81  
26857 Salerano sul Lambro (LO)  
Ιταλία
3. **IRCA Service S.p.A.**  
S.S. Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Ιταλία
4. **GALENKA – FITOFARMACIJA a.d.**  
Batajnicky drum b.b.  
11080 Belgrade  
Σερβία
5. **DIACHEM S.p.A.**  
Via Tonale, 15 – 24061  
Albano S. Alessandro (BG), Ιταλία
6. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**  
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, 196 00  
Μάνδρα Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **pyriproxyfen** 10 % (β/ο)  
Βοηθητικές ουσίες 88.91% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση όπως κατατέθηκε με την μεαρ. πρωτ. 11147/146769/26.10.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ .

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή Δοχείο	25 κ. εκ. – 1 λίτρο	COEX
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	30 – 500 κ.εκ.	COEX Κουτί χάρτινο

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. Λάβετε όλα τα μέτρα προφύλαξης.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Να μη συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και γενικά μυζητικά έντομα). Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο) παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

**5** Φάσμα δράσης




Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα	κ.εκ. / στρέμμα (μέγιστο)		
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b> <b>Πορτοκαλιά</b> CIDSΙ <b>Μανταρινιά</b> CIDRE <b>Λεμονιά</b> CIDLI	<b>Κοκκοειδή</b> ( <i>Saissetia oleae</i> – SAISOL, <i>Lepidosaphes beckii</i> - LEPSBE, <i>Aonidiella aurantii</i> – AONDAU, <i>Parlatoria pergandei</i> – PARLPE)	35 – 75	200 – 300	225	Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς	1

<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> <b>Μηλιά</b> MABSD <b>Αχλαδιά</b> PYUCO	<b>Κοκκοειδή</b> ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> – QUADPE, <i>Pseudalacaspis pentagona</i> – PSEAPE)	30	80 – 100	30	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59)	1
<b>Ροδακινιά</b> PRNPS	<b>Κοκκοειδή</b> ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> – QUADPE, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> – PSEAPE)	30	80 – 100	30	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59)	1
<b>Βερικοκιά</b> PRNAR <b>Κερασιά</b> PRNAV	<b>Κοκκοειδή</b> ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> – QUADPE, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> – PSEAPE)	30	80 – 100	30	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59)	1
<b>ΕΛΙΑ</b> OLVEU	<b>Λεκάριο</b> <i>Saissetia oleae</i> - SAISOL	30	100 – 125	37,5	Πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς (3) (BBCH 09-59)	1
<b>Τομάτα</b> LYPES, θερμοκηπίου	<b>Αλευρώδεις</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA	50	100 – 150	75	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (2) (BBCH 50-89)	2 (1)
<b>Πιπεριά</b> CPSSS Θερμοκηπίου	<b>Αλευρώδεις</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA	50	100 – 150	75	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (2)	2 (1)
<b>Αγγούρι</b> CUMSA, θερμοκηπίου	<b>Αλευρώδεις</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> – TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA	50	100 – 150	75	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (2) (BBCH 50-89)	2 (1)
<b>ΒΑΜΒΑΚΙ</b> GOSSS	<b>Αλευρώδεις</b> <i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA	-	40 – 80	50	Πριν το άνοιγμα των καρυδίων και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων (έως BBCH 79)	1

ΠΕΥΚΑ <sup>4</sup> αστικών και περιαστικών περιοχών	<i>Marchalina hellenica</i> – MARCHE	75	Καλή διαβροχή	-	Όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών (4)	1 (με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.)
--	--	----	------------------	---	--	--

**Παρατηρήσεις:**

1. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25°C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη
2. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του KITROFIN.
3. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της *Parlatoria oleae*
4. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί:
  - Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας
  - **Τρόπος εφαρμογής:** ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchallina hellenica* μερών των πεύκων. **Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου.**
  - **Απαγορεύσεις:**  
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα.  
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών.  
Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον.
  - **Περιορισμοί προφυλάξεις:**  
Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό.  
Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.  
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.  
Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.  
Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchallina hellenica* σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:  
**A. Σε κοινόχρηστους χώρους**, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.  
**B. Σε ιδιωτικούς χώρους** (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.  
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει pyriproxyfen σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.
- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας --
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν --
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό Υγρό
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
- 9** Προειδοποιητική λέξη  
Εικονογράμματα κινδύνου
- KINΔΥΝΟΣ**
-   
- GHS07 GHS08 GHS09**
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας
- H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
**EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
- 11** Δηλώσεις Προφύλαξης
- P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα  
**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  
**SPo2:** Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση  
**SP1:** ΜΗ ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).  
**SPe 3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα εσπεριδοειδή,
- 25m + ζώνη βλάστησης 20m για τα μηλοειδή,
- 10m + ζώνη βλάστησης 10m για τα πυρηνόκαρπα
- 12m +ζώνη βλάστησης 10m για την ελιά,
- 5m για τα λαχανικά

**SPe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην το εφαρμόζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών όταν χρησιμοποιείτε δόση μεγαλύτερη από 75 κ.εκ./ στρέμμα ή όταν υπάρχουν μελιτώδη εκκρίματα.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P301+P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

**P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για να εξασφαλιστεί καλό ξέπλυμα. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

## 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	28
Ροδακινιά	14
Τομάτα, πιπεριά, αγγούρι	3
Λοιπές καλ/γείες	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Πεύκα	Μη εφαρμόσιμο

## 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από πηγές θερμότητας, σε χώρο ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια

## 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.



**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**