



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 03-10-2019
Αριθ. πρωτ: 9723/235600**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρήσ
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: pthedoris@minagric.gr**

**Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΩΡΟΥ 18-20, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6955 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Flint® 50 WG (δ.ο. trifloxystrobin) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας).»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β΄ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.
6. Την Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 100997/30.4.2004 με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6955 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FLINT 50 WG,
7. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 9723/235600/20.09.2019 και 9564/231159/17.09.2019 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με ΑΑΔΑ 6955 έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **Flint® 50 WG (δ.ο. trifloxystrobin)** ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας- σημείο 5).

| 5 Φάσμα δράσης | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες |
| | | γρ. σκευάσμ. / στρέμμα (max) | γρ. σκευάσμ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | | |
| Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα) (VITVI) | Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> (UNCINE) | 12,5 | 12,5 | 30-100 | Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο μήκους βλαστού 10 εκ. μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής. Το προϊόν εμφανίζει δευτερεύουσα δράση εναντίον του περονόσπορου (<i>Plasmopara viticola</i>). (BBCH 14 – 79) | 3/10-14 |
| Μηλιά (MABSD) | Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN) | 7,5-10 | 7,5-10 | 100-150 | Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγεθος καρπού ημίσεως του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το οίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. (BBCH 09 - 75) | 3/10-12 |
| | Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> (PODOLE) | 10 | 10 | 100-150 | | |
| Αχλαδιά (PYUCO) | Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN) | 7,5-10 | 7,5-10 | 100-150 | | |
| | Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> (PODOLE) | 10-15 | 10 | 100-150 | | |
| | Στεμφύλιο <i>Stemphylium spp.</i> (STEMSP) | 15 | 15 | 100 | | |
| Ροδακινιά (PRNPS) Νεκταρινιά (PRNPN) Βερικοκιά (PRNAR) | Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> (SPHRPA) | 15 | 15 | 100 | Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγεθος του καρπού να φτάσει το 90% τελικού μεγέθους. (BBCH 69 - 79) | 3/10-14 |
| Ελιά (OLVEU) | Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium</i> | 10-15 | 10 | 100-150 | Από το στάδιο όπου οι βλαστοί φτάνουν | 2 / Μόνο 1 εφαρμογή |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|-------|--|--|
| | <i>oleaginum</i> (CYCLOL) Γλοιοσπόριο * (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (COLLGL), <i>Colletotrichum acutatum</i> (COLLAC), <i>Colletotrichum clavatum</i> (COLLCL) | | | | το 70% του τελικού μεγέθους μέχρι και το στάδιο όπου ο καρπός αποκτάει ανοιχτό πράσινο-κίτρινο χρώμα. (BBCH 37 - 79) | επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου. |
| Τομάτα (Θ) (LYPES) | Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA) | 12,5 | 12,5 | 100 | Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων). (BBCH 21 - 89) | 3/10-14 |
| Πεπόνι (Α,Θ) (CUMME) | Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI), <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU) | 12,5 25** | 12,5 25** | 100 | Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων). (BBCH 21 - 89) | 3/10-14 |
| Ρύζι (ORYSA) | Καφέ κηλίδωση φύλλων <i>Bipolaris sp.</i> (BIOPSP) Πυρικούλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> (PYRIOR) | 25 | --- | 30-60 | Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) από την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους έως την έναρξη της άνθησης. (BBCH 30-61) | 1/-- |

Παρατηρήσεις:

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρήση στο γλοιοσπόριο της ελιάς, ο κάτοχος της έγκρισης δε φέρει ευθύνη για πιθανή αποτυχία.

**Στο πεπόνι προτείνεται η εφαρμογή της μεγαλύτερης δόσης των 25 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης προσβολής και για μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα.

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 100997/30.4.2004 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14680 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Flint® 50 WG (δ.ο. trifloxystrobin) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ