



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.03.2020
Αριθ. πρωτ: 2347/59305

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κορνηλία Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ IMPREGILO S.p.A.-
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Λ. Μεσογείων 85
Τ.Κ. 151 26 Αθήνα
pmoutafis@jvit.gr

Κοιν.: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
dimitris.theodosiou@basf.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60789 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CENTURY SL (potassium phosphonates 755g/L) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήση)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας» και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 3 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6. Τη με αριθ. πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60789 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CENTURY SL (potassium phosphonates 755g/L), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 2347/59305/21.02.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 60789 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CENTURY SL (potassium phosphonates 755g/L), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 8206/108570/21-12-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα εφαρμογών
		κ.εκ./σπρ. (max)	κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού /σπρ.		
Μηλοειδή Μηλιά (ΜΑΒΡΜ) Αχλαδιά (ΡΥΥCΟ) Κυδωνιά (CΥDΟΒ)	<u>Φουζικλάδιο</u> <i>Venturia inaequalis</i> , (VENTIN), <i>Venturia pyrina</i> (VENTPI)	186	155-930	20-120	Προληπτικές εφαρμογές, στο διάστημα από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 53-81)	6/5-10 ημέρες.
Λωτός (DΟSKΑ) (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP)	400	266.6 - 2000	20-150	Προληπτικές εφαρμογές, από την αρχή της άνθισης έως και την πλήρη ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 53-87)	4/5 ημέρες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (NNNZZ) (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Φυτόφθορα <i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	186 Έγχυση 4 κ.εκ./ δέντρο	155-930	20-120	Ψεκασμοί/ έγχυση (στα δέντρα) την άνοιξη έως το φθινόπωρο	6/ 5-10 ημέρες Εγχύσεις: 1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1. Συνδυάζεται πάντα σε μείγματα βυτίου με μυκητοκτόνο επαφής όπως τα DELAN 70 WG (dithianon 70% β/β), POLYRAM WG (metiram 80% β/β), MERPAN 80 WG (captan 80% β/β), για να επιτυγχάνεται η καλύτερη προστασία των φυτών.</p> <p>2. Σε περίπτωση ανάμιξης να ακολουθείται ο μεγαλύτερος χρόνος επέμβασης πριν τη συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.</p> <p>3. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.</p>						
<p>Η χρήση στις παρακάτω καλλιέργειες της Καστανιάς, Φουντουκιάς, Καρυδιάς, Αμυγδαλιάς, Φιστικιάς και Ροδιάς θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) στον κανονισμό 396/2005 που να καλύπτουν την παρακάτω Ορθή Γεωργική Πρακτική. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>						
Καστανιά (CSNSA) Φουντουκιά (CYLAV) Καρυδιά (IUGRE) (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας)	Φυτόφθορα* <i>Phytophthora spp</i> (PHYTSP) Βακτηρίωση** <i>Xanthomonas arboricola pv juglandis</i> (XANTJU) Ανθράκνωση** <i>Gnomonia leptostyla</i> (GNOMLE) και <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP)	400	200-2000	20-200	Προληπτικές εφαρμογές, από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 09-85)	6/5 ημέρες.
Αμυγδαλιά (PRNDU) Φιστικιά (PIAVE) (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας)	Βοτρύτης <i>Botryosphaeria dothidea</i> (BOTSDO) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP) Φυτόφθορα <i>Phytophthora spp</i> (PHYTSP)	400	200-2000	20-200	Προληπτικές εφαρμογές, από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 09-85)	6/5 ημέρες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ροδιά (PUNGR) (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Βοτρύτης <i>Botrytis spp.</i> (BOTRSP) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP) Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> <i>spp.</i> (PHYTSP)	240	120 - 342,8	70-200	Προληπτικές εφαρμογές, από την αρχή της άνθισης εωσότου οι καρποί φτάσουν στο 50% του τελικού τους μεγέθους, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 61-75)	3/14 ημέρες.
--	---	-----	----------------	--------	--	--------------

* Για Φυτόφθορα κάνετε συνολικά 4 εφαρμογές. 2 εφαρμογές από το τέλος της άνθισης έως και την έναρξη του σχηματισμού των καρπών (BBCH: 68-71) και 2 εφαρμογές κατά την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 83-85).

** Για Βακτηρίωση και Ανθράκωση κάνετε 4 εφαρμογές από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι και το τέλος της άνθισης (BBCH: 09-69).

Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσοнос σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ.Α.Α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ