



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.10.2019  
Αριθ. πρωτ: 10601/255458

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
(Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
15125 Μαρούσι)

e-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70202 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70202 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 10601/255458/09.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70202 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	<u>Αγρωστώδ</u> η <u>Ζιζάνια</u> <sup>(1)</sup>	200	-	15-40	Κάνετε ανοιξιότιμες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των καρπών.	1
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα)		Για Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Αλεπονουρά ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ), Πολύανθη ήρα ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Αιματόχορτο ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ), Βέλιουρας ( <i>Sorghum halepense</i> ), Σετάρια ( <i>Setaria</i> spp.), Βρόμος ( <i>Bromus</i> spp.), Πάνικο ( <i>Panicum dichotomiflorum</i> ), Φάλαρη ( <i>Phalaris</i> spp.), Λεπτόχλοα ( <i>Leptochloa fascicularis</i> ), Φέστουκα ( <i>Festuca</i> spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και			Κάνετε ανοιξιότιμες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το πλήρες κλείσιμο των σταφυλιών.	1
Πατάτα					Κάνετε εφαρμογές κατά την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος (BBCH 10-19)	1
Καρότο, Χρένο, Ραπανάκι, Σελινόριζα, Παστινάκη, Λαγόχορτο					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του ριζώματος.	1
Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 5 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του βολβού.	1
Τομάτα, Πυεριά, Μελιτζάνα					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 2 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 3 <sup>ου</sup> πλευρικού βλαστού.	1
Λευκό					Κάνετε εφαρμογές	1

Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο)		βρώμης, Άγρια είδη κριθαιού και βρώμης			από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του κεντρικού στελέχους.	
Μαρούλι, Σκαρόλα, Λυκοτρίβολο Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο, Σπανάκι, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά		400 για Αγριάδα ( <i>Cynodon dactylon</i> ), Κόκκινο ρύζι ( <i>Oryza rufipogon</i> )			Κάνετε εφαρμογές από το 3 <sup>ο</sup> ως το 9 <sup>ο</sup> φύλλο.	1
Φασόλια (φρέσκα με λοβό), Φασόλι (ξερό), Μπιζέλι (ξερό), Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια		500 για Αγρόπυρο ( <i>Agropyron repens</i> )			Κάνετε εφαρμογές από το 3 <sup>ο</sup> σύνθετο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 <sup>ου</sup> μεσογονατίου διαστήματος.	1
Ζαχαρότευτλο Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Παντζάρι					Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> ζεύγους φύλλων ως την πλήρη ανάπτυξη της ροζέτας.	1
Βαμβάκι					Κάνετε εφαρμογές από το 2 <sup>ο</sup> φύλλο ως το στάδιο έκπτυξης όλων των πλαγιών βλαστών.	1
Ελαιοκράμβη					Κάνετε εφαρμογές από το 3 <sup>ο</sup> φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 <sup>ου</sup> μεσογονατίου διαστήματος.	1
Σόγια					Κάνετε εφαρμογές από το 4 <sup>ο</sup> ως το 9 <sup>ο</sup> σύνθετο φύλλο.	1
Ηλίανθος					Κάνετε εφαρμογές από το 2 <sup>ο</sup> ως το 8 <sup>ο</sup> φύλλο.	1
Παρατηρήσεις: 1) - <u>Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:</u>						

α. ευαίσθητα: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Σετάρια (*Setaria* spp.), Βρόμος (*Bromus* spp.), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum*), Φάλαρη (*Phalaris* spp.), Λεπτόχλοα (*Leptochloa fascicularis*), Φέστουκα (*Festuca* spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (*Hordeum* spp.) και βρώμης (*Avena* spp.),

β. μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum*)

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα:

α. ευαίσθητα: Κόκκινο ρύζι (*Oryza rufipogon*), β. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (*Cynodon dactylon*)

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:

α. μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (*Agropyron repens*)

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#)

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Φασόλι (ξερό), Μπιζέλι (ξερό), Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια	56
Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο.	42
Καρότο, Ραπανάκι	35
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια (φρέσκα με λοβό), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό Λάχανο, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά	28
Πιπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα, Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο	21
Βαμβάκι	Δεν ορίζεται
Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Παστινάκη, Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος.	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ