



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25.10.2019
Αριθ. πρωτ: 8474/205199

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165

Προς: **Χελλαφάρμ ΑΕ.**
 Φλέμιγκ 15, Τ.Κ.: 151 23, Μαρούσι
 e-mail: info@hellafarm.gr

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Κοιν: **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.**
AGRIBIZ, Ξενίας 1 ΑΘΗΝΑ 11527
 e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14488 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT 97,6 EC (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήση), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1608 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για το παραφινέλαιο (CAS 8042-47-5), μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης διάφορων δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 (πρόγραμμα ανανέωσης AIR IV).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένου Δ/σης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 8817/96673/26.08.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14488 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT 97,6 EC (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 8474/205199/13.08.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 14488 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT 97,6 EC (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 8817/96673/26.08.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, το σημείο **5**, **11** και **13.1** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	κ.εκ. σκευάσματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE) (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά (CIDSI)	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU) Παρλατόρια (<i>Parlatoria pergandei</i> - PARLPE) και άλλες ψώρες	1000-1500	100-220	1000-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1 – 2 />60
	Αλευρώδεις (<i>Dialeurodes citri</i> - DIALCI, <i>Aleurothrixus floccosus</i> - ALTHFL)	1000-1500	50-220	500-2240	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή	1 – 2 />60

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά (ΜΑΒSΔ), Αχλαδιά (ΡΥΥCΟ)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadrascidiotus perniciosus</i> -PARLPE) και άλλες ψώρες	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1
	Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	750-1000	125- 150	940-1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά (ΡRΝΑΡ), Κερασιά (ΡRΝΑV), Ροδακινιά (ΡRΝΡS), Δαμασκηινιά (ΡRΝΔΟ)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadrascidiotus perniciosus</i> -PARLPE) και άλλες ψώρες	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1
	Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	750-1000	125	940-1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση	
Ελιά (ΟΛVΕΥ)	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i> *- PARLOL) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> *- SAISOL) Πολλίνια (<i>Pollinia pollini</i> *- POLNPO) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> *- ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i> *-LEPSUL) Ψώρες (<i>Leucaspis riccae</i> *- LEUARI) (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> *- CHRYDI) Ακάρια (<i>Eriophyes vitis</i> *- ERPHVI) (<i>Tegolophus hassani</i> *-TEGLSP) (<i>Oxycenus</i>	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων ως μικρούς καρπούς	1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	<i>maxwelli</i> *- ΟΧΥΝΜΑ) (<i>Eotetranychus</i> <i>carpini</i> *-EOTECA)					
Ακτινιδιά* (ΑΤΙΔΕ) Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidotus</i> <i>perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> - PSEAPE) Μετκάλφα (<i>Metcalfa</i> <i>pruinosa</i> - METFPR) Βαμβακάδα (<i>Eurphyllura</i> sp.- EURHSP) Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus</i> <i>ulmi</i> -METTUL)	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή	2

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ.
3. Κατά τη χρήση του SUPPORT 97,6 EC τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32οC γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Ελιά και Ακτινιδιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11

**Δηλώσεις
προφύλαξης**

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
 Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
 10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **Ελιά και Ακτινιδιά**.
 20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **Ελιά και Ακτινιδιά**.
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ελιά, Ακτινιδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8817/96673/26.08.2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

I. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ