



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25.10.2019  
Αριθμ. πρωτ: 9828/238151

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas AEBE  
Λεωφ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα Αττικής  
e-mail: Anna.Gkatzouni@syngenta.com  
Georgia.Diakou@syngenta.com

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 60372 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDE LY 50 EW (cyflufenamid 5,13% β/ο) ως προς την ημερομηνία λήξης, την επικαιροποίηση των στοιχείων της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/1559 της Επιτροπής της 16ής Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες **cyflufenamid**, fenbusconazole, fluquinconazole και tembotrione μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/1527 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **cyflufenamid**, fluopicolide, heptamaloxylglucan και malathion.
5. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένου Δ/νσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.

6. Την από 09.02.2017 αξιολόγηση (Registration Report) της Γαλλίας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
7. Τη με αριθμό πρωτ. 2963/33116/31.05.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60372 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDELY 50 EW (cyflufenamid 5,13% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3506/68894/03.04.2019 αίτηση καθώς και τις υπ' αριθ. πρωτ. 9828/238151/24.09.2019 και 10716/256826/10.10.2019 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60372 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDELY 50 EW (cyflufenamid 5,13% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2963/33116/31.05.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης, την επικαιροποίηση των στοιχείων της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **1.1β, 1.4.στ, 4, 5, 7, 9, 10, 11** και **13.1** διαμορφώνονται ως εξής:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60372
31.05.2013
<b>31.03.2024</b>

#### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: cyflufenamid **5,13% β/ο**  
 Βοηθητικές ουσίες: 94,89% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 187747/04.08.2010 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

- 4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Το CIDELY 50 EW είναι ένα μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου **σε αμπέλι** (*Uncinula necator*), **σε μηλιά** (*Podosphaera leucotricha*) και **σε ροδακινιά και βερικοκιά** (*Sphaerotheca pannosa*).

Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	κ.εκ./ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Αμπέλι (VITVI) Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> (UNCINE)	40-50	50	80-100	Προληπτική επέμβαση από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την ανάπτυξη των ραγών.	2/ 10-14 ημέρες
Μηλιά (MABSD)	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> (PODOLE)	30-50	50	90-150	Προληπτικές επεμβάσεις από τα πρώτα ξεδιπλωμένα φύλλα μέχρι πριν τη συγκομιδή.	2/ 7-10 ημέρες
Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR)	Ωίδιο <i>(Sphaerotheca pannosa</i> ή <i>Podosphaera pannosa)</i> (SPHRPA)	25-50	50	50-100	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο των πλήρως αναπτυγμένων φύλλων μέχρι πριν τη συγκομιδή. (BBCH 19-87).	2/ 7 ημέρες

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- Η δόση και ο όγκος του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών και τη φυλλική επιφάνεια.
- Εφαρμόστε το CIDELY 50 EW όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά τις πρώτες ενδείξεις προσβολής από το ωίδιο.
- Όπου η πίεση της ασθένειας παραμένει υψηλή ή υπάρχει επαναπροσβολή, μπορεί να επαναληφθεί ο ψεκασμός. Εφαρμόζεται 2 φορές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 μέρες εάν υπάρχει πίεση από την ασθένεια.
- Το προϊόν διαθέτει εκλεκτικότητα στα ωφέλιμα αρθρόποδα της οικογενείας *Phytoseiidae*.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-
-
<b>Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στην φυλλική επιφάνεια.</b>

**9** Εικονογράμματα κινδύνου

GHS09

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208:** Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*«Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος»*

*«Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια»*

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**SPE1:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία cyflufenamid περισσότερο από μία φορά στα δύο χρόνια στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της βερικοκιάς.

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Μηλιά	14
Αμπέλι	21
<b>Ροδακινιά, Βερικοκιά</b>	<b>14 ημέρες</b>

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2963/33116/31.05.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**