



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 23.03.2020**  
**Αριθ. πρωτ: 692/17936**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**Πληροφορίες:** Κορνηλία Μητσοπούλου  
**Τηλέφωνο:** 210 92 87 165  
**e-mail:** kmitsopoulou@minagric.gr

**Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**  
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
 Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  
 dimitris.theodosiou@basf.gr

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60935 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LONSELOR 30 SC (fluxarygoxad 30% β/ο) ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 7933/76610/13.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60636 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERCADIS 30 SC (fluxarygoxad 30% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 13831/330246 π.ε./06.02.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60935 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LONSELOR 30 SC (fluxarygoxad 30% β/ο).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 692/17936/20.01.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθμό 60935 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LONSELOR 30 SC (fluxarγοχαδ 30% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 13831/330246 π.ε./06.02.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **4, 5, 6** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **Αμυγδαλιά και Φιστικιά** με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxarγοχαδ ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο II (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI, κατάταξη FRAC C2 ). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζιο Οινοποιήσιμο & Σταφίδα)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe necator</i> -UNCINE)	15	20-120	Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. BBCH 11-83	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες
Μηλιά MABSD  Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN, <i>Venturia pyrina</i> - VENTPI)	25-30	20-120	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. BBCH 53-81	3 εφαρμογές
	Στεμφύλιο ( <i>Stemphylium sp.</i> -STEMSP)				
	Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha</i> -	15	20-120	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης	

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	PODOLE)			κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. BBCH 53-81	
Ροδακινιά-PRNPS, Βερικοκιά-PRNAR	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> - SPHRPA)	15	50-150	Εφαρμογές από το φύσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-85	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Αμυγδαλιά* PRNDU (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φαιά σήψη ( <i>Monilinia laxa</i> -MONILA, <i>Monilinia fructicola</i> -MONIFC)	30	100-120	Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών.	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Φιστικιά* PIAVE (χρήση ήσσονος σημασίας)	Καμαροσπόριο ( <i>Botryosphaeria dothidea</i> -BOTSDO)	30	100-120	Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών.	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες

\* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.»

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείρισης ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία fluxaryoxad, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα C2 (μυκητοκτόνα SDHI) κατά FRAC.

Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**Στην Αμυγδαλιά και στη Φιστικιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.**

**13**

## Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυσλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σταφύλια, Μήλα, Αχλάδια	35
Ροδάκινα, Βερικόκα	21
<b>Αμυγδαλιά, Φιστικιά</b>	<b>14</b>

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**B**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13831/330246 π.ε./06.02.2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**