



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.11.2019
Αριθμ. πρωτ: 3689/74026

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas AEBE
Λεωφ. Ανθούσας
15349 Ανθούσα Αττικής
e-mail: Anna.Gkatzouni@syngenta.com
Georgia.Diakou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60372 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDELE 50 EW (cyflufenamid 5,13% β/ο) ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήση), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/1559 της Επιτροπής της 16ής Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες **cyflufenamid**, fenbuconazole, fluquinconazole και tembotrione μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
6. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένου Δ/νσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β΄ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.

7. Τη με αριθμό πρωτ. 2963/33116/31.05.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60372 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDELY 50 EW (cyflufenamid 5,13% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 3689/74026/09.04.2019 και 9828/238151/24.09.2019 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A	Τροποποιούμε την με αριθμό 60372 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CIDELY 50 EW (cyflufenamid 5,13% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 2963/33116/31.05.2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις
----------	--

Συγκεκριμένα, τα σημεία **4, 5, 11** και **13** διαμορφώνεται ως εξής:

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης	Το CIDELY 50 EW είναι ένα μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε αμπέλι (<i>Uncinula necator</i>), σε μηλιά (<i>Podosphaera leucotricha</i>) και στα πυρηνόκαρπα (<i>Sphaerotheca pannosa</i>). Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου.
----------	-----------------------------	---

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	κ.εκ./ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Αμπέλι (VITVI) Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> (UNCINE)	40-50	50	80-100	Προληπτική επέμβαση από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την ανάπτυξη των ραγών.	2/ 10-14 ημέρες
Μηλιά (MABSD)	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> (PODOLE)	30-50	50	90-150	Προληπτικές επεμβάσεις από τα πρώτα ξεδιπλωμένα φύλλα μέχρι πριν τη συγκομιδή.	2/ 7-10 ημέρες
Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> ή <i>Podosphaera pannosa</i>) (SPHRPA)	25-50	50	50-100	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο των πλήρως αναπτυγμένων φύλλων μέχρι πριν τη συγκομιδή. (BBCH 19-87).	2/ 7 ημέρες

Κερασιά* (PRNAV) Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωΐδιο (<i>Sphaerothe- ca rannosa</i> ή <i>Podosphaera rannosa</i>) (SPHRPA)	25-50	50	50-100	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο των πλήρως αναπτυγμένων φύλλων μέχρι πριν τη συγκομιδή. (BBCH 19-87).	2/ 7 ημέρες
Δαμασκηλιά* (PRNDO) Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωΐδιο (<i>Sphaerothe- ca rannosa</i> ή <i>Podosphaera rannosa</i>) (SPHRPA)	25-50	50	50-100	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο των πλήρως αναπτυγμένων φύλλων μέχρι πριν τη συγκομιδή. (BBCH 19-87).	2/ 7 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η δόση και ο όγκος του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών και τη φυλλική επιφάνεια.
- Εφαρμόστε το CIDELY 50 EW όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά τις πρώτες ενδείξεις προσβολής από το ωΐδιο.
- Όπου η πίεση της ασθένειας παραμένει υψηλή ή υπάρχει επαναπροσβολή, μπορεί να επαναληφθεί ο ψεκασμός. Εφαρμόζεται 2 φορές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 μέρες εάν υπάρχει πίεση από την ασθένεια.
- Το προϊόν διαθέτει εκλεκτικότητα στα ωφέλιμα αρθρόποδα της οικογενείας *Phytoseiidae*.
- *Για τις χρήσεις ήσσοнос σημασίας Κερασιά και Δαμασκηλιά: δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

11	Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.</p> <p>P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p> <p>P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p>«Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος» «Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια»</p> <p>SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.</p> <p>SPe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία cyflufenamid περισσότερο από μία φορά στα δύο χρόνια στα πυρηνόκαρπα.</p>
-----------	------------------------	--

13 Προστασία των καταναλωτών		
13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Καλλιέργειες	Ημέρες
	Μηλιά	14
	Αμπέλι	21
	Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	14 ημέρες

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2963/33116/31.05.2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ