

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.12.2019
Αριθ. πρωτ: 14052/334121

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
151 25 Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60684 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (δ.ο. *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600) ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις).»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί η δραστική ουσία *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2016/1429 της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2016 για την έγκριση της δραστικής ουσίας *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/1777, της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος FZB24, *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600, αργιλούχο ξυλάνθρακα, dichlorprop-P (διχλωροπρόπιο-P), ethephon (αιθεφόνη), etridiazole (ετριδιαζόλη), flonicamid

(φλονικαμίδη), fluazifor-P (φλουαζιφόπιο-P), υπεροξείδιο του υδρογόνου, μεταλδεΐδη, penconazole (πενκοναζόλη), spinetoram (σπινετοράμη), *Urtica spp.* και tau-fluvalinate (τφλουβαλινάτη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
8. Τη με αριθμό 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' /2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
9. Την με αριθ. 619/46787/08.03.2019 (ΦΕΚ Β' 988/22.03.2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25.06.2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
10. Τη με αριθμό πρωτ. 7518/100271/16.07.2018 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την με αριθμό 60684 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERIFEL (δ.ο. *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 3626/50852/05.06.2018 απόφαση μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις).

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών
		γραμ./ στρέμμα	γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Αμπέλι (Επιτραπέζιο & Οινοποιήσιμο) (VITVI)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	50		50-100	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από το τέλος της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή. (BBCH 67-89)	10/7
Φράουλα (Υ+Θ) (FRAAN)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	50		20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 55-89)	6/5

<p>Μούρα και μικροί καρποί (Υ+Θ): Φραγκοστάφυλο μαύρο (RIBNI) Φραγκοστάφυλο κόκκινο (RIBRU) Φραγκοστάφυλο κόκκινο, πράσινο κίτρινο (RIBAU) Μούρα-σμέουρα/ <i>Rubus</i> x <i>Iogonobaccus</i> (RUBLO) Σμέουρο κόκκινο, κίτρινο (RUBID) Μύρτιλλα (RIBAU, VACMY)</p>	<p>Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)</p>	50		20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 55-89)</p>	6/5
<p>Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Υ+Θ) (SOLME)</p>	<p>Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)</p>	50		20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση ως και την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 51-89)</p>	6/5
<p>Μαρούλι (Υ+Θ) (LACSA) και σαλατικά (Υ+Θ): Ρόκα (ERUVE, DIPER), Λυκοτρίβολο (VLLLO, VLLER), Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια Κιχώριο Κοκκινόχρωμο κιχώριο (LACSE, CIGEN CIGEL, CIGIN, CIGIF), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες (LEPSA, LEPCA) Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης)</p>	<p>Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, <i>Sclerotinia minor</i> - SCLESP)</p>	50		20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή. (BBCH 10-49)</p>	6/5

Σπανάκι (Υ+Θ) (SPQOL)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> - SCLESP)	50		20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή. (BBCH 10-49)	6/5
Βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ+Θ): Μαϊντανός* (PARCR), Φραγκομαϊντανός* (ANRCE), Σχοινόπρασο* (ALLSC), Φύλλα σέλινου* (APUGV), Φύλλα άνηθου* (AFEGR), Φασκόμηλο* (SALOF), Δενδρολίβανο* (RMSOF), Θυμάρι* (THYSS), Βασιλικός* (OCIBA), Δάφνη*/ Δαφνόφυλλα* (LURNO), Δρακόντιο*/ Εστραγκόν* (ARTDR) (χρήσεις ήσσονος σημασίας)	Βοτρύτης (<i>Botrytis sp.</i> - BOTRSP)	50		20-200	Προληπτικές Εφαρμογές από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τυπικό για την καλλιέργεια μέγεθος. (BBCH 10-49)	6/5
Φασόλι* (Υ) (Χωρίς λοβό) (PHSVX) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Βοτρύτης (<i>Botrytis sp.</i> - BOTRSP)	50		20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την άνθιση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών. (BBCH 61-89)	6/5
Λαχανάκια Βρυξελλών* (Υ) (BRSOFF) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Βοτρύτης (<i>Botrytis sp.</i> - BOTRSP)	50		20-200	Προληπτικές εφαρμογές ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη ανάπτυξη των	6/5

					καρπών. (BBCH 10-49)	
Μπάμιες* (Υ) (ABMES) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Βοτρύτης (<i>Botrytis sp.</i> - BOTRSP)	50		20-200	Προληπτικές εφαρμογές, ξεκινώντας από την εμφάνιση του 5^{ου} άνθους, μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 55-89)	6/5

Παρατηρήσεις:

1. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό ή σε εναλλαγή με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα εναντίον του βοτρύτη.
2. Συστήνεται η εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι απορροής, αποφεύγοντας τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή σχετική υγρασία.
3. Να μην χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια ή εάν αναμένεται βροχόπτωση.
4. Χρησιμοποιήστε τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού για μεγαλύτερα ή πυκνότερα πρέμνα.
5. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε πριν την προσβολή. Το Serifel® παρέχει προληπτική προστασία. Επαναλάβετε συχνά την εφαρμογή.

Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας*:

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 3626/50852/05.06.2018 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

I. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ