



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.02.2020  
Αριθ. πρωτ: 689/17925

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

Κοιν: 1. Γραφείο Υπουργού ΑΑ&Τ κ. Μ. Βορίδη  
minister-mailbox@hq.minagric.gr  
2. Γραφείο ΓΓ ΑΑ&Τ κ. Γ. Στρατάκου  
gensecr@hq.minagric.gr

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60924 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SARI 40 SC (pyrimethanil 40 % β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

#### ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 13118/142055/19.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60586 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil 40% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τη με αριθ. πρωτ. 13923/331897 π.ε./22.01.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60924 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SARI 40 SC (pyrimethanil 40 % β/ο).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 689/17925/20.01.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Τροποποιούμε την με αριθμό 60924 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SARI 40 SC (pyrimethanil 40 % β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 13923/331897 π.ε./22.01.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα
		κ.εκ. σκ. / στρέμμα	κ.εκ. σκευασμ. / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
Μηλιά MABSD,  Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN <i>Venturia pyrina</i> - VENTPI)	110-150	75-100	150	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την πράσινη κορυφή. Η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής και από το στάδιο πριν την άνθιση ως το στάδιο που οι καρποί έχουν διάμετρο 20 χιλιοστών (καρπίδιο). Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα μυκητοκτόνα κατά του φουζικλαδίου, η δόση του Sari 40 SC μπορεί να	4/7-10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

					μειωθεί σε 50-60 κ.εκ. ανά εκατόλιτρο. (BBCH 10-72)	
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i> ) Δευτερογενείς προσβολές από <i>Aspergillus</i> sp.- ASPESP και <i>Penicillium</i> sp.- PENISP	200-250	200	100-125	Κάνετε εφαρμογές κατά την τυπική περίοδο καταπολέμησης του βοτρύτη, δηλαδή, στο τέλος της άνθισης, πριν το κλείσιμο των σταφυλιών, κατά την ωρίμανση ή 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Εξασφαλίστε μια καλή και ομοιόμορφη κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό. (BBCH 69 έως 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	1/-
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο)						3/14
Φράουλα FRAAN (αγρού)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i> )	200-250	150-200	100-125	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. (BBCH 55 έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	3/7-14

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φράουλα FRAAN (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. (BBCH 55 έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	2/7-14
Μαρούλι LACSA Σκαρόλα CICEL (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν κατά την κύρια βλαστητική ανάπτυξη. Καλύψτε με το ψεκαστικό υγρό την περιοχή του λαιμού και τα εξωτερικά φύλλα που ακουμπούν στο έδαφος. (BBCH 19 έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	2/10-14
Τομάτα LYPES, Μελιτζάνα SOLME (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. (BBCH 29 έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	3/10-14
Πιπεριά CPSAN (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. (BBCH 29 έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	3/10-14

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: (Αγγούρι CUMSA, Αγγουράκι CUMSA, Κολοκυθάκι CUUPE) (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. (BBCH 29 έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	3/10-14
Καρότο DAUCS (αγρού)	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria dauci</i> - ALTEDA) Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	200	200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 4 φύλλων. (BBCH 14 έως 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	2/10-14
Κρεμμύδι ALLCE (αγρού)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis</i> spp.- BOTRSP)	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 3-6 φύλλων. (BBCH 13 έως 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	3/10
Φασολάκι PHSVX (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	150-200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. (BBCH 29 έως 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή)	2/10-14

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κυκλάμινο CYZSS (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i> )	150-225	100-150	-	Κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/7-10
Αμυγδαλιά* PRNDU  (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φαιά σήψη ( <i>Monilinia laxa</i> - MONILA, <i>Monilinia</i> <i>fructicola</i> - MONIFC)	150	100-150	100-150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-85)	2/7
Φιστικιά* PIAVE  (χρήση ήσσονος σημασίας)	Καμαροσπόριο ( <i>Botryosphaeria</i> <i>dothidea</i> - BOTSDO)	150	100-150	100-150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-85)	2/7

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της Αμυγδαλιάς και της Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη»

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
 P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης, της φόρτωσης και της εφαρμογής να φοράτε κατάλληλα γάντια. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].

SRe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε από επιφανειακά ύδατα μια αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων για το αμπέλι και
- 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για μηλιά, αχλαδιά, καλλωπιστικά φυτά, Αμυγδαλιά και Φιστικιά.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	56
<b>Αμυγδαλιά, Φιστικιά</b>	<b>30</b>
Αμπέλι	21
Μαρούλι, Σκαρόλα (Α+Θ), Καρότο (Α), Κρεμμύδι (Α), Φασολάκι (Θ)	14
Φράουλα (Α+Θ), Τομάτα, Μελιτζάνα (Α+Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Θ)	3
Κυκλάμινο (Α+Θ)	Δ.Ε.

**B** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13923/331897 π.ε./22.01.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΙΟΣ