



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.03.2020  
Αριθ. πρωτ.: 904/23215

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 223  
e-mail: [ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)

Προς: Dow Agrosiences Export SAS  
(Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας  
της εταιρείας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  
[vasilis.kourousias@corteva.com](mailto:vasilis.kourousias@corteva.com))  
Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού Α.Α. & Τ.: κ. Μ. Βορίδη  
[minister-mailbox@hq.minagric.gr](mailto:minister-mailbox@hq.minagric.gr)  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Α. & Τ.:  
κ. Γ. Στρατάκου  
[gensecr@hq.minagric.gr](mailto:gensecr@hq.minagric.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SKADI (δ.ο. propyzamide 40% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

7. Τη με αριθ. 7956 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO 400 SC (δ.ο.: propyzamide 40% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 95710/13.04.2011 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
11. Τις με αριθ. πρωτ. 1448/35955/03.02.2020 και 904/23215/23.01.2020 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SKADI της εταιρείας Dow Agrosciences Export SAS με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70383</b>
<b>03.03.2020</b>
<b>30.06.2026</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

<b>SKADI</b>
Πυκνό εναιώρημα (SC)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>propyzamide</b>
--------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

propyzamide: 92% β/β min
--------------------------

Χημική ομάδα

Βενζαμίδια
------------

Παρασκευαστής

<b>Dow AgroSciences LLC</b> 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, ΗΠΑ
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>Dow AgroSciences LLC</b> 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, ΗΠΑ
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 3-11-2009 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 133772) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
---

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Dow AgroSciences Export SAS**

6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus  
78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία  
e-mail: [vasilis.kourousias@corteva.com](mailto:vasilis.kourousias@corteva.com)  
Τηλ.: 210 688 9700

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6889700  
e-mail: [vasilis.kourousias@corteva.com](mailto:vasilis.kourousias@corteva.com)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη,  
Τ.Θ 1089,  
Τ.Κ.570 22  
Τηλ.: 2311 998600  
Fax: 2311 998601  
e-mail: [registrations@agrology.eu](mailto:registrations@agrology.eu)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Dow AgroSciences LLC**

9330 Zionsville Road Indianapolis,  
IN 46268, ΗΠΑ

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  
επιχείρησης:

**Dow AgroSciences Italia Srl, Ιταλία**

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  
επιχειρήσεων:

1. **Dow AgroSciences Italia Srl, Ιταλία**
2. **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη,  
Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22
3. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200  
Ύπατο Βοιωτία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:**propyzamide: 40% β/ο****Βοηθητικές ουσίες: 61,8% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος,  
προσδιορίζεται στη με αριθμό πρωτ.  
8039/87807/01.08.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης  
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και  
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ.εκ. έως 5 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) ή PET

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά ή αμέσως μετά την μεταφύτευση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπλαστικά. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
<b>Ακρόδρυα:</b> Αμυγδαλιά PRNDU <b>Καρυδιά</b> IUGRE <b>Καστανιά</b> CSNSA	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1
<b>Μηλοειδή:</b> <b>Μηλιά</b> MABSD <b>Αχλαδιά</b> PYUCO <b>Κυδωνιά</b> CYDOB	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1

<b>Πυρηνόκαρπα:</b> <b>Ροδακινιά</b> PRNPS <b>Βερικοκιά</b> PRNAR <b>Δαμασκηνιά</b> PRNDO <b>Κερασιά</b> PRNAV	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1
<b>Αμπέλι</b> VITVI	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1
<b>Μπρόκολο</b> BRBOK <b>Λάχανο</b> BRBOL	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	250	-	20-40	α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, β) αμέσως μετά τη μεταφύτευση (BBCH 00-09)	1
<b>Κουνουπίδι</b> BRBOB	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	-	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση (BBCH 00-09)	1
<b>Μαρούλι</b> LACSA	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	-	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση (BBCH 00-09)	1
<b>Ραδίκι</b> CICIN	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	-	20-40	Μεταφυτρωτικά έως το 4 <sup>ο</sup> φύλλο (BBCH 12-13)	1
<b>Αντίδι</b> CICEN	Κουσκούτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	-	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1

<b>Φασολάκια νωπά</b> PHSVX	Κουσκοúτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1
<b>Αγκινάρα</b> CYUSC <b>Άγρια αγκινάρα</b> CYUCA	Κουσκοúτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	-	20-40	Μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης βλαστού	1
<b>Φακή</b> LENCU	Κουσκοúτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1
<b>Ηλίανθος</b> HELAN	Κουσκοúτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά (BBCH 00-09)	1
<b>Ελαιοκράμβη</b> BRSNN	Κουσκοúτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	187,5	-	20-40	Μετά το στάδιο των 2-4 φύλλων	1
<b>Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι</b>	Κουσκοúτα καθώς και ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	375	-	20-40	Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 50% της επιφάνειας του εδάφους	1

**Παρατηρήσεις:**

\* Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

**Πλατύφυλλα:** Κουσκοúτα (*Cuscuta* spp.- CVCG), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*- POLAV), Αγριοπιπεριά (*P. Persicaria*- POLPE), Λουβουδιά (*Chenopodium album*- CHEAL), Βερόνικα (*Veronica* spp.- VERG), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*- POROL).**Αγρωστώδη:** Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*- ALOMY), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*- ECHCG), Κοινή πόα (*Poa annua*- POAAN).

1. Στα φυλλώδη λαχανικά για την καλύτερη καταπολέμηση της κουσκοúτας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 500κ.εκ./στρέμμα.

2. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SKADI.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα:

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

- 1) Αγκινάρες, ραδίκι, μαρούλι, σκαρόλα: κανένα.
  - 2) Ψυχανθή, καλαμπόκι, σόργο, καρότο, πατάτα, σέλινο, φράουλα, βαμβάκι: 5 μήνες.
  - 3) Ζαχαρότευτλα, σπανάκι, κολοκυνθοειδή, λάχανο, ελαιοκράμβη, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα: 8 μήνες.
  - 4) Σιτηρά, αγρωστώδη για βοσκή, γρασίδια: 12 μήνες.
- Το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί SKADI πρέπει να οργωθεί σε βάθος 15 εκ. πριν να σπαρεί με σιτηρά, αγρωστώδη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν αναφέρεται παραπάνω. Οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μέγιστοι που απαιτούνται. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να μειωθεί σε θερμά κλίματα καθώς και όταν χρησιμοποιούνται οι χαμηλές δόσεις εφαρμογής.

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**Προσοχή**



GHS08

GHS09

**H351:** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208:** Περιέχει 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer με formaldehyde και methylphenol, sodium salt και 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P102 + P405:** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απσέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

*Γενικές συμβουλές:* Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκαστήρες πλάτης.

**12** Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο:

**P302+P361+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε/ Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P304+P340+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P305+P351+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P301+P330+P331+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**



**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	PHI (σε ημέρες)
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά) Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά) Πυρηνόκαρπα: (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά)	Μη εφαρμόσιμο
Αμπέλι	Μη εφαρμόσιμο
Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι	60 ημέρες
Μαρούλι, Αντίδι	28 ημέρες
Ραδίκι	Μη εφαρμόσιμο
Φασολάκια νωπά	90 ημέρες
Αγκινάρα	60 ημέρες
Άγρια αγκινάρα	120 ημέρες
Φακή	90 ημέρες
Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη	Μη εφαρμόσιμο
Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι	Μη εφαρμόσιμο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο [Παράρτημα III](#) του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος αναφοράς (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO 400 SC (δ.ο.: propryzamide 40% β/ο) με αριθ. έγκρισης 7956 και αριθμό πρωτ. 95710/13.04.2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΚ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΙΟΣ**