



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.Ιουλίου.2020
Αριθμ. πρωτ: 6673/181299

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ
Θέση Ντράσεζα, (ΒΙ.ΠΑ.)
19011-Αυλώνας Αττικής
e-mail: info@elton-group.com
agro@elton-group.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 1111 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και στην τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 11111 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 6673/181299/06.07.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 11111 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 1133/18277/30.01.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και στην τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα)		
<u>Κολοκυνθοειδή:</u> Αγγούρι (Θ) CUMSA, Κολοκυθάκι (Θ) CUYPE Πεπόνι (Θ) CUMME, Κολοκύθα (Θ) CUYPE	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) SPHRFU	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως τον 3 ^ο καρπό με τυπικό μέγεθος και μορφή (BBCH 13-73).	5 / 7 ημέρες
<u>Σολανώδη:</u> Τομάτα (Θ) LYPES, Πιπεριά (Θ) CPSAN, Μελιτζάνα (Θ) SOLME, Πεπίνι (Θ) SOLMU	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) LEVETA	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 13-89).	5 / 7 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) UNCINE, Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) PLASVI	200	200-500	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών (BBCH 12-89).	8/8-10 ημέρες
Σπανάκι (Υ+Θ)* SPQOL (χρήση ήσσονος σημασίας)	Περονόσπορος (<i>Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae</i>) PEROFS Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) SPHRFU,	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών (BBCH 13-89)	5/7 ημέρες

	(<i>Erysiphe cichoracearum</i>) ERYSCI					
Άνηθος (Υ+Θ)* AFEGR <i>(χρήση ήσσονος Σημασίας)</i>	Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i>) ERYSHE	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας (BBCH 13-89)	5/7 ημέρες
Αγκινάρα (Υ)* CYUSC <i>(χρήση ήσσονος Σημασίας)</i>	Ωίδιο (<i>Leveillula Taurica</i>) LEVETA, (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) ERYSCI, (<i>Oidium cyclaminis</i>) OIDICY	200	260-1000	20-75	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας (BBCH 13-89)	5/7 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1. Το Fytosave εφαρμόζεται προληπτικά, σε εναλλαγή με κατάλληλα μυκητοκτόνα ανάλογα με την πίεση των ασθενειών. Να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χαμηλής ή μέτριας προσβολής.
2. Για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών, συνιστώνται 2-4 διαδοχικές εφαρμογές στο αμπέλι και 2-3 εφαρμογές στα κηπευτικά πριν την εμφάνιση των ασθενειών.
3. Σε περίπτωση προσβολής ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων και αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλο διασυστηματικό μυκητοκτόνο πριν την εφαρμογή του Fytosave.
4. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

*«Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του σπανακιού, του άνηθου και της αγκινάρας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου (Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Κολοκύθα)	0
Σολανώδη θερμοκηπίου (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπίνι)	0
Αμπέλι (για επιτραπέζιες ποικιλίες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3
Σπανάκι (Υ+Θ), Άνηθος (Υ+Θ), Αγκινάρα (Υ)	0

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1133/18277/30.01.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ